

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Lygal® Kopfsalbe N

Wirkstoff: Salicylsäure (Ph. Eur.)

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

1 g Salbe enthält 30 mg Salicylsäure (Ph. Eur.)

Sonstige Bestandteile:

Schweineschmalz, emulgierender Cetylstearylalkohol, Macrogol 300, Macrogol 1500, Macrogolglycerolricinoleat, weißes Vaselin

Darreichungsform und Inhalt

Lygal® Kopfsalbe N Tube mit 50 g Salbe N2

Lygal® Kopfsalbe N Tube mit 100 g Salbe N3

Lygal® Kopfsalbe N Dose mit 200 g Salbe

Salbe mit hornhautreicher Wirkung

Taurus Pharma GmbH

Benzstr. 11

61352 Bad Homburg

Tel.: 06172/139683

Fax: 06172/171550

Hersteller:

Artesan Pharma GmbH & Co. KG

Wendlandstr. 1

29439 Lüchow

Anwendungsgebiete

Abschuppung von Hornzellen, z. B. bei Schuppenflechte (Psoriasis) des behaarten Kopfes und bei Kopfschuppen

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Lygal® Kopfsalbe N nicht anwenden?

Dieses Arzneimittel darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen Salicylsäure und Salicylate oder Bestandteile der Salbengrundlage (s. Zusammensetzung).

Wann dürfen Sie Lygal® Kopfsalbe N erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Im Folgenden wird beschrieben, wann Sie Lygal Kopfsalbe N nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion (Niereninsuffizienz) sollte Lygal Kopfsalbe N nur in Ausnahmefällen kleinflächig (behandelte Körperoberfläche max. 10 cm²) höchstens bis zu drei Tagen angewendet werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

- Schwangerschaft

Lygal® Kopfsalbe N sollte in der Schwangerschaft nicht angewendet werden. Fragen Sie hierzu Ihren behandelnden Arzt.

- Stillzeit

Die zufällige Aufnahme von Salicylsäure durch den Säugling auf Grund von Kontakt mit der behandelten Körperstelle (Kopf) muss vermieden werden.

Was ist bei Kindern und älteren Menschen zu berücksichtigen?

Bei Säuglingen darf Lygal® Kopfsalbe N nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Lygal® Kopfsalbe N darf nicht mit Schleimhäuten in Berührung kommen, insbesondere ist ein Kontakt mit den Augen zu vermeiden. Versehentlich dort aufgetragene Lygal® Kopfsalbe N ist sofort zu entfernen.

Die Durchlässigkeit der Haut für Salicylsäure kann u. a. bei Hauterkrankungen, die mit Rötungen und Entzündungen (z. B. psoriatische Erythrodermie) oder mit oberflächlich nässenden Veränderungen der Haut einhergehen, erhöht sein.

Lygal® Kopfsalbe N nicht mit Lack oder Kunststoff (z. B. Möbel, Brillen usw.) in Berührung bringen, da diese Gegenstände unter Umständen matt werden können.

Wechselwirkungen

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Lygal® Kopfsalbe N?

Salicylsäure kann das Eindringungsvermögen anderer äußerlich angewendeter Arzneimittel verstärken. Die vom Körper aufgenommene Salicylsäure kann die Wirkung von Methotrexat und von Sulfonylharnstoffen (bestimmte orale Anti-

diabetika) verändern.

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Lygal[®] Kopfsalbe N nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Lygal[®] Kopfsalbe N sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel Lygal[®] Kopfsalbe N und wie oft sollten Sie Lygal[®] Kopfsalbe N anwenden ?

Soweit nicht anders verordnet, wird Lygal[®] Kopfsalbe N einmal täglich auf die erkrankte Kopfhaut aufgetragen. Die maximale tägliche Dosis für Erwachsene beträgt 2 g Salicylsäure (entspricht ca. 67 g Salbe) beziehungsweise für Kinder 0,2 g Salicylsäure (entspricht ca. 7 g Salbe).

Wie und wann sollten Sie Lygal[®] Kopfsalbe N anwenden?

Die Haare nach und nach an verschiedenen Stellen scheiteln und die Lygal[®] Kopfsalbe N auf die Kopfhaut (auf den Scheitel) auftragen und einreiben.

Anschließend lassen Erwachsene Lygal[®] Kopfsalbe N bevorzugt über Nacht 8 – 12 Stunden einwirken. Danach kann die Salbe mit einem milden Shampoo ausgewaschen werden.

Bei Kindern kann die Einwirkzeit entsprechend kürzer sein, wobei je nach Alter 2 – 6 Stunden empfehlenswert sind. Es ist dabei darauf zu achten, daß die Tagesdosis von ca. 7 g Salbe (entsprechend 0,2 g Salicylsäure) nicht überschritten werden darf.

Wie lange sollten Sie Lygal[®] Kopfsalbe N anwenden?

Die Tageshöchstdosis für Erwachsene von 2 g Salicylsäure (entspricht ca. 67 g Salbe) beziehungsweise für Kinder von 0,2 g Salicylsäure (entspricht ca. 7 g Salbe) darf nicht länger als eine Woche angewendet werden.

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was ist zu tun, wenn Lygal[®] Kopfsalbe N in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Überdosierungen von Lygal[®] Kopfsalbe N sind bei lokaler Anwendung im Allgemeinen nicht zu erwarten. Örtlich kann es zu Hautreizungen kommen. Bei auftretenden Symptomen genügt als Gegenmaßnahmen das Absetzen von Lygal[®] Kopfsalbe N und das Entfernen des Präparates.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Lygal[®] Kopfsalbe N angewendet haben oder eine Anwendung vergessen haben?

Die Wirksamkeit von Lygal[®] Kopfsalbe N ist nur durch eine regelmäßige Anwendung gewährleistet. Holen Sie eine vergessene Anwendung baldmöglichst nach und behalten Sie Ihr altes Anwendungsschema bei! Bitte befragen Sie hierzu auch Ihren behandelnden Arzt.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Ein selbständiges zu frühes Abbrechen der Behandlung mit Lygal[®] Kopfsalbe N kann den Behandlungserfolg gefährden. Lygal[®] Kopfsalbe N sollte solange wie vom Arzt verordnet angewendet werden.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Lygal[®] Kopfsalbe N auftreten?

Gelegentlich (weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten) treten lokale Hautreizungen (Brennen und Rötung) auf, und sehr selten (weniger als 1 von 10000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle) kann es zu allergischen Reaktionen kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Beenden Sie die Behandlung mit Lygal[®] Kopfsalbe N und befragen Sie Ihren Arzt.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und dem Behältnis aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Nach Anbruch des Behältnisses soll Lygal[®] Kopfsalbe N innerhalb von 3 Monaten verbraucht werden.

Stand der Information

Dezember 2004

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!



TAURUS
P H A R M A

Ein Unternehmen der Poli-Gruppe